

Plaatsen Dubbel J-stent

Beste,

Heden werd ureterstent geplaatst. Hierbij geven we u graag nog enige toelichting over de zorgen de komende dagen.

Normale zorgen

Het is normaal dat de eerste uren er branderigheid tijdens het plassen optreedt. Er kan ook wat pijn zijn in de flank(en) als gevolg van de procedure

Zichtbaar bloed in de urine is eveneens normaal de eerste 24-48u en telkens na activiteit of inspanning zolang de stent aanwezig is.

Pijn in de nier tijdens en onmiddellijk na het plassen is normaal, ook meer frequente en sterkere aandrang om te plassen is gevolg van de aanwezigheid van de stent.

Mogelijke problemen

Blaasontsteking: Ondanks alle voorzorgen kan een blaasontsteking na deze ingreep optreden, dit zal u merken aan toenemende klachten van pijn bij het plassen, pijn in de onderbuik, zeer vaak gaan plassen, eventueel koorts. In dit geval neemt u best contact op met de huisarts om en urinestaal te laten onderzoeken en gepast antibioticum te starten. Indien uw huisarts niet beschikbaar is kan u zich wenden tot het ziekenhuis.

Nierbekkenontsteking: Naast de symptomen van een blaasontsteking maakt u hoge koorts en/of rikoorts. In dit geval moet u zich onmiddellijk aanmelden op de dienst Spoedgevallen waar een antibioticum zal gestart worden via een infuus.

Bij vragen of problemen kan u steeds terecht op ons secretariaat (03/760.23.59) van 8u00 tot 18u00.

Met vriendelijke groeten,

Dr. T Claeys

Dr. F Vanhaverbeke

Dr. S De Prycker

Dr. H P Wynant

Dr. B De Troyer